

Lekarze nie są pewni, co wywołuje szpiczaka, wiadomo jednak, że istnieje szereg czynników zwiększających ryzyko zachorowania.

Do czynników tych należą:

- Wiek

Ryzyko zachorowania na szpiczaka rośnie z wiekiem. U osób poniżej 40 roku życia szpiczak występuje rzadko; najczęściej rozpoznawany jest u osób powyżej 65 lat.

- Rasa

Szpiczak występuje dwa razy częściej w populacji afro-karaibskiej niż w populacji białej.

- Płeć

Szpiczak występuje nieco częściej u mężczyzn niż u kobiet.

- Wykonywana praca

Niektóre zawody (związane np. z rolnictwem czy przemysłem petrochemicznym) niosą z sobą większe ryzyko zachorowania na szpiczaka, prawdopodobnie ze względu na oddziaływanie substancji szkodliwych.

- Promieniowanie

U osób narażonych na wysoki poziom promieniowania ryzyko zachorowania jest większe.

Nieco wyższe jest ryzyko zachorowania u osób, które mają bliskich krewnych chorych na szpiczaka. Podobnie jak inne nowotwory, szpiczak nie jest zakaźny; nie można się nim zarazić od innych.

Ostatnia aktualizacja: 09.2010 r.

Następna planowana aktualizacja: 2013 r.

