

| Rodzaj schematu | Wskazanie                                                                                                                                   | Leki |     |       |                |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------------|-----------|
|                 |                                                                                                                                             | Dni  | Lek | Dawka | Sposób podania | Komentarz |
| VAD             | Leczenie opornych postaci choroby, może być stosowany w pierwszej linii leczenia u chorych planowanych do przeszczerpu nieterujących talido |      |     |       |                |           |

|  |          |                   |                          |                                      |                     |                                                              |
|--|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | mid<br>u | 1-4               | Dox<br>orub<br>icyn<br>a | 9mg<br>/m <sup>2</sup> /<br>dob<br>ę | wle<br>w ci<br>agły | Daw<br>ka<br>na<br>cykl<br>36m<br>g/ <sup>2</sup>            |
|  |          | 1-4,<br>12-1<br>5 | Dex<br>ame<br>tazo<br>n  | 40m<br>g/<br>dob<br>ę                | po                  | Do<br>połk<br>nięc<br>ia w<br>trak<br>cie<br>posi<br>łku     |
|  |          | 1-4               | Win<br>krys<br>tyna      | 0,4<br>mg/<br>dob<br>ę               | wle<br>w ci<br>agły | Daw<br>ka<br>na<br>cykl<br>–<br>1,6<br>mg/<br>m <sup>2</sup> |

1.Częstość podawania – co 21 dni  
2.Maksymalna ilość cykli: 4-6  
3.Wlew ciagły może być podawany tylko przez wkłucie centralne,  
4.Rekomendowane leczenie towarzyszące:

- Bisfosfoniany,
- Profilaktyka przeciwzakrzepowa,
- Onseprazol 20 mg/dł, łącznie z Dexametazonem,
- Profilaktyka przeciwwymiotna.