

Schemat 3: MPT (Melfalan, Prednison, Talidomid)

| Rodzaj schematu | Wskazanie                                                              | Leki                      |             |                     |                |                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|                 |                                                                        | Dni                       | Lek         | Dawka               | Sposób podania | Komentarz                                                |
|                 |                                                                        | 1-7                       | Alkeraan    | 4 mg/m <sup>2</sup> | po             |                                                          |
|                 |                                                                        | Codziennie bez przerwania | Talidomid   | 100 mg/d            | po             | Pojawieniu się toksyczności dawkę można redukowac do 50% |
| MPT             | Pierwsza linia leczenia u chorych starszych i w gorszym stanie ogólnym | 1-7                       | Prednizolon | 40mg/m <sup>2</sup> | po             | Rano, z posiłkiem                                        |

1.Częstość podawania – co 28 dni

2.Maksymalna ilość cykli: 4-6

3.Rekomendowane leczenie towarzyszące:

- Bisfosfoniany,
- Profilaktyka przeciwwakrzepowa,
- Profilaktyka przeciwinfekcyjna: Fluconazol 50mg/d, Heviran 2x400mg/mg, Biseptol 480mg 2 x dziennie -codziennie,
- Omeprazol 20 mg/d, łącznie z Prednizolonem,
- Leki przeciwcisnąjące.

