Schemat 9: PAD (Bortezomib, Adriamycyna, Dexametazon)

Rodzaj schematu	**Wskazanie**	**Leki**				
PAD	Oporna lub nawrotowa postać choroby	Dni	Lek	Dawka	Sposób podania	Komentarz
		1,4,8,11	Bortezomib	1,3 mg/m^2	IV	Bolus 3-5 sek.
		1-4	Doxo-rubicyna	9mg/m^2/d dawka całkowita na kurację 36 mg/m^2	IV	Wlew ciągły w 0,9% NaCl, 4 doby
		1-4	Dexa-metazon	40 mg/m^2	po	Rano, z posiłkiem

1.Częstość podawania – co 21 dni
2.Maksymalna ilość cykli: 4-6
3.Dexametazonu w pierwszym cyklu powinien być podawany również w dniach 8-11 oraz 15-18
4.Wlew ciągły może być podawany tylko przez wkłucie centralne,
5.Rekomendowane leczenie towarzyszące:

- Bisfosfoniany,
- Omeprazol 20 mg/d, łącznie z Dexametazonem,

- Profilaktyka przeciwwymiotna,
- Profilaktyka przeciwinfekcyjna: Fluconazol 50mg/d, Heviran 2x400mg/mg, Biseptol 480mg 2 x dziennie-codziennie.