

Schemat 10: Podskróny Valcade

Rodzaj schematu	Wskazanie	Leki				
		Dni	Lek	Dawka	Sposób podania	Komentarz
Valcade s.c.	Leczenie nawrotowej/progresującej postaci choroby, chorzy z polineuropatią (zgodnie z protokołem terapeutycznym NFZ)	1,2,4, 5,8,9, 11,12	Dexametazon	20mg raz dziennie	po	Od 4 cyklu, jeżeli brak PR
		1,4,8, 11	Bortezomib	1,3 mg/m ²	s.c.	Rozpuszczony w 1,4 ml NaCl, podawać podskórnie

1.Podskórne stosowanie Valcade zmniejszy ryzyko działań ubocznych, w tym neuropatii (42% w stos. podawania dożylnego)

2.Częstość podawania – co 21 dni

3.Maksymalna ilość cykli: 8

4.Od początku leczenia Valcade stosowany jest w monoterapii, jeżeli 5.Rekomendowane leczenie towarzyszące:

- Bisfosfoniany,
- Profilaktyka przeciwinfekcyjna: Fluconazol 50mg/d, Heviran 2x400mg/mg, Biseptol 480mg 2 x dziennie-codziennie,
- Omeprazol 20 mg/d, łącznie z Dexametazonem,
- Redukcja dawki w neuropatii.